

### Tabletten

Wirkstoffe: Acidum silicicum Trit. D4,  
Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D4

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Revoten® und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Revoten® beachten?
3. Wie ist Revoten® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Revoten® aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. WAS IST REVOTEN® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Revoten® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bindegewebes.

Die Anwendungsgebiete entsprechen den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu gehört: Bindegewebsschwäche.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON REVOTEN® BEACHTEN?**

Revoten® darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen Acidum silicicum oder Calcium carbonicum Hahnemanni oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Revoten® einnehmen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Revoten® ist erforderlich. Wichtige Information über einen bestimmten sonstigen Bestandteil von Revoten®: Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Revoten® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### **Kinder und Jugendliche**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern und Jugendlichen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es darf deshalb bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

### **Einnahme von Revoten® zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Keine Wechselwirkungen bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

### **Einnahme von Revoten® zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Revoten® in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **3. WIE IST REVOTEN® EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder

Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1–3-mal täglich 1 Tablette einnehmen. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Revoten® eingenommen haben, als Sie sollten, die Einnahme vergessen haben oder die Einnahme abbrechen**

Folgen von Überdosierung, unterlassener Einnahme, abruptem Absetzen: Keine.

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bei Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Laktoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. WIE IST REVOTEN® AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

### **Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 25° C lagern!

## **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Revoten® enthält**

Die Wirkstoffe sind: Acidum silicicum Trit.D4,  
Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D4

### **1 Tablette enthält:**

Wirkstoffe:

Acidum silicicum Trit.D4	5 mg
Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D4	5 mg

### **sonstige Bestandteile:**

Laktose-Monohydrat, Magnesiumstearat.

### **Wie Revoten® aussieht und Inhalt der Packung**

Revoten® ist in Packungen mit 30 (3x 10) und 90 (9x 10) Tabletten erhältlich.

### Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Fischer Gesundheitsprodukte GmbH,  
Am Haag 14, 82166 Gräfelfing  
Tel.: 089/7879790-78, Fax: 089/7879790-79  
E-Mail: [info@fgp-pharma.de](mailto:info@fgp-pharma.de)

### Hersteller:

SCHUCK GmbH  
Industriestr. 11, 90571 Schwaig  
Tel. 0911/500185, Fax 0911/508802  
E-Mail: [info@schuck-arzneimittel.de](mailto:info@schuck-arzneimittel.de)